



| BRANCHE         | SECTION(S) | ÉPREUVE ÉCRITE  |
|-----------------|------------|---|
| Mathématiques I | C          | Durée de l'épreuve : 1 h 45 minutes<br>Date de l'épreuve : 01/06/21 |

**Question 1** (12 + (7 + 3) = 22 points)

- Résoudre dans  $\mathbb{C}$  l'équation  $3z^3 - (8 - 9i)z^2 + (9 - 23i)z - 36 - 12i = 0$  sachant qu'elle admet une solution imaginaire pure.
- On donne les nombres complexes suivants :  
 $z_1 = (1 + i\sqrt{3})^2$  ;  $z_2 = 2(1 - i)$  et  $Z = \frac{z_1}{z_2}$ .
  - Mettre  $z_1, z_2$  et  $Z$  sous forme trigonométrique et sous forme algébrique.
  - En déduire les valeurs exactes de  $\cos\left(\frac{11\pi}{12}\right)$  et de  $\sin\left(\frac{11\pi}{12}\right)$ .

---

**Question 2** (5 + (1+6) = 12 points)

- Déterminer un système d'équations paramétriques de la droite  $d$  passant par le point  $P(2, 3, 5)$  et parallèle à l'intersection des plans d'équation  $3x - y + z = 0$  et  $x - y + z = 0$ .
- On donne les cinq points  $A(-1; 2; 6)$ ,  $B(5; -7; -4)$ ,  $C(2; -3; 5)$ ,  $D(4; 6; -1)$  et  $E(3; -4; 2)$ .
  - Vérifier que les points C, D et E ne sont pas alignés.
  - Déterminer l'intersection de la droite (AB) avec le plan (CDE).

---

**Question 3** (10 points)

- Déterminer les valeurs du paramètre réel  $m$  pour lesquelles le système suivant admet une solution unique :
$$\begin{cases} x + my + 2z = m \\ -2x + y + (m - 2)z = 1 \\ mx + y + 2z = 2m - 1 \end{cases} \quad \text{avec } m \in \mathbb{R}$$
- Résoudre le système ci-dessus pour  $m = 0$  et pour  $m = 1$  et interpréter les résultats géométriquement.

**Question 4** (1 + 1 + 1 + 2 + 4 + 4 + 3 = 16 points)

Une urne contient les 6 jetons suivants :  $\{\boxed{1}, \boxed{2}, \boxed{3}, \boxed{4}, \boxed{5}, \boxed{6}\}$ .

1. On tire simultanément 4 jetons. Combien de tirages différents peut-on former ?
2. On tire successivement sans remise 6 jetons et on les aligne. Combien de nombres différents formés de 6 chiffres peut-on ainsi former ?
3. On tire successivement sans remise 4 jetons et on les aligne. Combien de nombres différents formés de 4 chiffres peut-on ainsi former ?
4. On tire simultanément 5 jetons. Combien de tirages différents contenant 2 chiffres pairs et 3 chiffres impairs peut-on former ?
5. On tire simultanément 5 jetons. Combien de nombres différents peut-on former si on les aligne de manière à ce que 2 chiffres pairs soient toujours séparés par un chiffre impair (ou bien que 2 chiffres impairs soient toujours séparés par un chiffre pair) ?
6. On tire successivement avec remise 8 jetons. Combien de tirages différents contenant au moins 2 jetons  $\boxed{6}$  peut-on former ?
7. On rajoute 3 jetons  $\boxed{1}$  aux 6 jetons d'origine. Combien de nombres différents peut-on former en utilisant tous ces jetons ?

## Formules trigonométriques

|  |   |   |
|--|---|---|
| $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$                                    |   |   |
| $\cos^2 x = \frac{1}{1 + \tan^2 x}$                          | $\sin^2 x = \frac{\tan^2 x}{1 + \tan^2 x}$                | $1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$       |
| $\sin(\pi - x) = \sin x$                                     | $\sin(\pi + x) = -\sin x$                                 | $\sin(-x) = -\sin x$                      |
| $\cos(\pi - x) = -\cos x$                                    | $\cos(\pi + x) = -\cos x$                                 | $\cos(-x) = \cos x$                       |
| $\tan(\pi - x) = -\tan x$                                    | $\tan(\pi + x) = \tan x$                                  | $\tan(-x) = -\tan x$                      |
| $\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos x$                | $\sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \cos x$             |   |
| $\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin x$                | $\cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = -\sin x$            |   |
| $\tan\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cot x$                | $\tan\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = -\cot x$            |   |
| $\sin(x + y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y$                | $\tan(x + y) = \frac{\tan x + \tan y}{1 - \tan x \tan y}$ |   |
| $\sin(x - y) = \sin x \cos y - \cos x \sin y$                | $\tan(x - y) = \frac{\tan x - \tan y}{1 + \tan x \tan y}$ |   |
| $\cos(x + y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y$                |   |   |
| $\cos(x - y) = \cos x \cos y + \sin x \sin y$                |   |   |
| $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$                                  | $\cos^2 x = \frac{1}{2}(1 + \cos 2x)$                     |   |
| $\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x$                              | $\sin^2 x = \frac{1}{2}(1 - \cos 2x)$                     |   |
| $\sin 2x = \frac{2 \tan x}{1 + \tan^2 x}$                    | $\cos 2x = \frac{1 - \tan^2 x}{1 + \tan^2 x}$             | $\tan 2x = \frac{2 \tan x}{1 - \tan^2 x}$ |
| $\sin 3x = 3 \sin x - 4 \sin^3 x$                            | $\cos 3x = -3 \cos x + 4 \cos^3 x$                        |   |
| $\sin p + \sin q = 2 \sin \frac{p+q}{2} \cos \frac{p-q}{2}$  | $\tan p + \tan q = \frac{\sin(p+q)}{\cos p \cos q}$       |   |
| $\sin p - \sin q = 2 \sin \frac{p-q}{2} \cos \frac{p+q}{2}$  | $\tan p - \tan q = \frac{\sin(p-q)}{\cos p \cos q}$       |   |
| $\cos p + \cos q = 2 \cos \frac{p+q}{2} \cos \frac{p-q}{2}$  |   |   |
| $\cos p - \cos q = -2 \sin \frac{p+q}{2} \sin \frac{p-q}{2}$ |   |   |
| $\sin x \cos y = \frac{1}{2}[\sin(x+y) + \sin(x-y)]$         |   |   |
| $\cos x \cos y = \frac{1}{2}[\cos(x+y) + \cos(x-y)]$         |   |   |
| $\sin x \sin y = \frac{1}{2}[\cos(x-y) - \cos(x+y)]$         |   |   |